

VACCINARI RECOMANDATE PENTRU PREVENTIA RISCULUI BIOLOGIC EXISTENT LA LOCUL DE MUNCA AL ANGAJATILOR

VACCINARE ANTIGRIPALA

Recomandata pentru:

- lucratori cu publicul
- cadre didactice
- recrutatori
- lucratori comerciali (magazine)
- cadre medicale
- ingrijitori etc

Avantaj angajator: reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

Perioada optima de vaccinare: octombrie-noiembrie.

Vaccin: Vaxigrip Tetra (1 administrare)

VACCINARE ANTITETANICA

Recomandata pentru angajati cu risc crescut de contaminare accidentala:

- lacatusi
- sudori
- muncitori necalificati
- legatori de sarcina
- electricieni
- constructori etc

Avantaj angajator: reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: VTA (vaccin tetanic adsorbit- 3 administrari)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP A

Hepatita virală tip A numită și "boala mainilor murdare", are calea de transmitere fecal-orală.

Recomandată pentru:

- persoane care lucrează în mediu cu expunere ridicată la condiții insalubre (subsoluri, conducte îngropate, scurgeri cu ape reziduale, instalații sanitare și termoficare etc)

Avantaj angajator: reducerea absenteismului și a costurilor datorate scoaterii din producție.

Perioada optimă de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrări)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP B

Calea de transmitere a Hepatitei virale tip B: sexuală, contactul cu sânge contaminat prin transfuzii, seringi reutilizabile, stomatologie, prin instrumente de manichiură-frizerie, endoscopii, tatuaje etc

Recomandată pentru:

- cadre medicale
- conducători auto profesioniști
- angajați care lucrează în închisori
- angajați care lucrează în: saloane de manichiură-pedichiură, frizerie, coafură etc
- angajați care lucrează cu sânge sau produse din sânge etc

Avantaj angajator: reducerea absenteismului și a costurilor datorate scoaterii din producție, reducerea cazurilor de accidente de muncă secundare expunerii la Virusul hepatitic B.

Perioada optimă de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrări), Engerix B (3 administrări)

VACCINARE INTERNATIONALA

Medicul epidemiolog (dnul. dr. Dan Decebal) recomandă, în cadrul consultului de specialitate, o serie de vaccinări adaptate zonei geografice unde va merge pacientul.