

## VACCINARI RECOMANDATE PENTRU PREVENTIA RISCULUI BIOLOGIC EXISTENT LA LOCUL DE MUNCA AL ANGAJATILOR

### VACCINARE ANTIGRIPALA

**Recomandata** pentru:

- lucratori cu publicul
- cadre didactice
- recrutatori
- lucratori comerciali (magazine)
- cadre medicale
- ingrijitori etc.

**Avantaj angajator:** reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

**Perioada optima** de vaccinare: octombrie-noiembrie.

**Vaccin:** Vaxigrip Tetra (1 administrare)

### VACCINARE ANTITETANICA

**Recomandata** pentru angajati cu risc crescut de contaminare accidentala:

- lacatusi
- sudori
- muncitori necalificati
- legatori de sarcina
- electricieni
- constructori etc

**Avantaj angajator:** reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

**Perioada optima** de vaccinare: tot timpul anului

**Vaccin:** VTA (vaccin tetanic adsorbit- 3 administrari)

### VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP A

Hepatita virala tip A numita si "boala mainilor murdare", are calea de transmitere fecal-orală.

**Recomandata** pentru:

- persoane care lucreaza in mediu cu expunere ridicata la conditii insalubre (subsoluri, conducte ingropate, scurgeri cu ape reziduale, instalatii sanitare si termoficare etc)

**Avantaj angajator:** reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

**Perioada optima** de vaccinare: tot timpul anului

**Vaccin:** TWINRIX (3 administrari)

## VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP B

Calea de transmitere a Hepatitei virale tip B: sexuala, contactul cu sânge contaminat prin transfuzii, seringi refolosibile, stomatologie, prin instrumente de manichiură-frizerie, endoscopii, tatuaje etc.

**Recomandata** pentru:

- cadre medicale
- conducatori auto profesioniști
- angajați care lucrează în închisori
- angajați care lucrează în: saloane de manichiura-pedichiura, frizerie, coafura etc
- angajați care lucrează cu sânge sau produse din sânge etc

**Avantaj angajator:** reducerea absenteismului și a costurilor datorate scoaterii din producție, reducerea cazurilor de accidente de muncă secundară expunerii la Virusul hepatitic B.

**Perioada** optimă de vaccinare: tot timpul anului

**Vaccin:** TWINRIX (3 administrări), Engerix B (3 administrări)

## VACCINARE INTERNATIONALA

Medicul epidemiolog recomandă, în cadrul consultului de specialitate, o serie de vaccinări adaptate zonei geografice unde va merge pacientul.