

VACCINARI RECOMANDATE PENTRU PREVENȚIA RISCULUI BIOLOGIC EXISTENT LA PACIENȚI EXPUSI LA DIVERSI AGENȚI PATOGENI

VACCINARE ANTIGRIPALA

Recomandată pentru:

- varstnici
- bolnavi cu afecțiuni cronice
- femei gravide
- copii 2-5 ani
- sugari 6-23 luni
- lucratori cu publicul
- cadre didactice
- recrutatori
- lucratori comerciali (magazine)
- cadre medicale
- îngrijitori etc

Perioada optimă de vaccinare: octombrie-noiembrie.

Vaccin: Vaxigrip Tetra (1 administrare)

VACCINARE ROTARIX

Rotarix se utilizează la **sugari începând de la vârsta de șase săptămâni** pentru a-i proteja împotriva gastroenteritei (diaree și vărsături) cauzate de infecția cu rotavirus. Prima doză se administrează când sugarul are vârsta peste șase săptămâni. Este de preferat ca ambele doze să se administreze înainte de vârsta de 16 săptămâni.

Aceeași schemă de vaccinare poate fi utilizată și la sugarii care s-au născut cu până la 13 săptămâni înainte de termen (începând cu vârsta gestațională de 27 de săptămâni). Rotarix se administrează în două doze, la un interval de cel puțin patru săptămâni.

VACCINARE ANTIPNEUMOCOCICA

Recomandată pentru:

- sugari, copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 săptămâni și 17 ani.
- adulți cu vârsta ≥ 18 ani și la varstnici

Număr de administrări: o singură administrare la adulți, 2 sau 3 la sugari și copii în funcție de indicațiile medicului.

Vaccin: Prevenar

VACCINARE ANTIRABICA

Recomandat următoarelor categorii de persoane: grupuri profesionale supuse la risc de contaminare, medici veterinari, asistenți veterinari (inclusiv studenți la facultatea de Medicină Veterinară), personalul tehnic ce lucrează împreună cu medicii veterinari, persoane din laboratoare ce manevrează material contaminat cu virus rabic, persoane din abatoare, târguri de animale, crescători de animale, fermieri, lucratori forestieri din zone enzootice, persoane care călătoresc în zone enzootice: Africa, America de Sud, Asia.

Numar de administrari: 3

Vaccin: Verorab

VACCINARE PROFILAXIE RUBEOLA, RUJEOLA, OREION

Recomandari:

- Imunizarea activa fata de rujeola, oreion si rubeola, incepand cu varsta de 12 luni, la copiii de ambele sexe.
- Imunizarea activa a copiilor care traiesc in colectivitati (crese, gradinite), incepand cu varsta de 9 luni. In acest caz este necesara revaccinarea copilului la varsta de 15 luni, cu acelasi vaccin Trimovax pentru a asigura o protectie perfecta.
- Imunizarea in cadrul masurilor preventive de vaccinare, a tuturor copiilor mai mari de 9 luni, dintr-o colectivitate, daca exista un risc epidemiologic.

Numar de administrari: pentru vaccinare este necesara o singura administrare, daca varsta copilului este cuprinsa intre 12-15 luni. Daca vaccinarea s-a inceput la varsta de 9 luni, pentru copii care traiesc in colectivitati, o a 2- a injectie este recomandata 6 luni mai tarziu (la varsta de 15 luni).

Vaccin: Priorix

VACCINARE ANTITETANICA

Recomandata pentru angajati cu risc crescut de contaminare accidentala:

- lacatusi
- sudori
- muncitori necalificati
- legatori de sarcina
- electricieni
- constructori etc

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: VTA (vaccin tetanic adsorbit- 3 administrari)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP A

Hepatita virala tip A numita si "boala mainilor murdare", are calea de transmitere fecal-orală.

Recomandata pentru:

- persoane care lucreaza in mediu cu expunere ridicata la conditii insalubre (subsoluri, conducte ingropate, scurgeri cu ape reziduale, instalatii sanitare si termoficare etc)

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrari)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP B

Calea de transmitere a Hepatitei virale tip B: sexuala, contactul cu sânge contaminat prin transfuzii, seringi refolosibile, stomatologie, prin instrumente de manichiură-frizerie, endoscopii, tatuaje etc.

Recomandata pentru:

- cadre medicale
- conducatori auto profesioniști
- angajati care lucreaza in inchisori
- angajati care lucreaza in: saloane de manichiura-pedichiura, frizerie, coafura etc
- angajati care lucreaza cu sange sau produse din sange etc

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrari), Engerix B (3 administrari)

VACCINARE INTERNATIONALA

Medicul epidemiolog recomanda, in cadrul consultului de specialitate, o serie de vaccinari adaptate zonei geografice unde va merge pacientul.